

## Список анализов, требуемых для оперативного лечения в глазной клинике «Оптикстайл»

№	Исследование	Срок действия заключения
1	Клинический анализ крови	10 дней
2	Общий анализ мочи	10 дней
3	Анализ крови на сифилис RPR	6 месяцев
4	Анализ крови на гепатит В, гепатит С-антигены + ВИЧ, Трепонема pallidum (РПГА или ИФА)	1 месяц
5	Рентген или флюорография легких	1 год
6	Рентген придаточных пазух носа	1 год
7	Коагулограмма (МНО; АЧТВ; ПТИ; фибриноген; тромбин; время)	10 дней
8	Биохимия крови (АСТ; АЛТ, сахар; общий белок; билирубин прямой, непрямой, общий; креатинин; мочевины)	10 дней
9	Консультация терапевта с допуском к операции и рекомендациями лечения сопутствующих заболеваний (при себе иметь все назначенные препараты)	10 дней
10	Консультация ЛОР-врача	1 месяц
11	Консультация стоматолога	10 дней
12	Группа крови + Rh-фактор	-
13	Консультация тех специалистов, у которых больной находится на диспансерном наблюдении	10 дней
14	При носительстве гепатита В или гепатита С-антигенов обязательна консультация инфекциониста	10 дней
15	ЭКГ	10 дней
16	За 3 дня до операции закапывать (в оперируемый глаз) глазные капли Офтаквикс 0,3% по 1 капле 4 раза в день	-

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ ПО ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ

1. Сдать анализы, назначенные врачом
2. Операция проводится при отсутствии острых и обострений хронических заболеваний.
3. Запрещается прием спиртного за 48 часов до проведения операции.
4. За 3 дня до операции начать закапывание глазных капель по назначению врача.

#### В день проведения операции:

1. Иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность.

2. Взять с собой хлопчатобумажную одежду (мужчинам – рубашку или футболку, брюки; женщинам - халат) с открытым воротом или большим вырезом спереди и коротким рукавом). Иметь при себе носки и тапочки.
3. Утром принять душ, женщинам удалить косметику. Запрещается пользоваться дезодорантами, туалетной водой, духами, одеколоном.
4. Съёмные протезы снять перед операцией
5. Утром принять легкий завтрак. Больным сахарным диабетом вопрос о питании решить с врачом-эндокринологом или терапевтом.
6. Иметь при себе суточный запас принимаемых лекарств. При госпитализации на 3-5 дней – на весь срок пребывания в клинике.
7. Продолжать лечение сопутствующей патологии, включая день операции, за исключением случаев, оговоренных с врачом-офтальмологом, врачом-анестезиологом, врачом-терапевтом.